Mis recordatorios de infusión de Lumvoa y seguimiento del progreso del tratamiento

Navegue cada infusión de Lumvoa con información y apoyo

USO e INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Uso: Lumvoa es un medicamento con receta que se usa para tratar la enfermedad ocular tiroidea (TED), tanto si la padece desde hace meses o años.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Lumvoa?

Las **reacciones a la infusión** pueden producirse durante o poco después de la infusión de Lumvoa. Informe a su médico o al personal de enfermería de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante o después del tratamiento con Lumvoa:

- Presión arterial alta
- Sensación de calor
- Escalofríos
- Dolor de cabeza
- Cansancio

Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 4 y 5, y la Información de Prescripción Completa.

Lumvoa™
veligrotug-vvze

VIRIDIAN™ cares

Consejos útiles para prepararse para su infusión de Lumvoa

Tenga en cuenta estos consejos para ayudarle a prepararse para el tratamiento

2 SEMANAS ANTES DE LA INFUSIÓN

- Confirme la fecha, la hora y la dirección de su cita.
- Llame a su médico para confirmar si es necesario realizar alguna evaluación adicional antes de empezar el tratamiento.
- Organícese para ausentarse del trabajo, el cuidado de los niños y la cobertura de cualquier otra responsabilidad en preparación para su ausencia.
- Póngase en contacto con su Contacto de Acceso para Pacientes (Patient Access Liaison, PAL).

1 SEMANA ANTES DE LA INFUSIÓN

- Confirme el transporte de ida y vuelta a su cita.
- Comuníquese con un amigo o familiar si necesita apoyo durante la infusión.

Su PAL es un recurso de apoyo fundamental durante todo su tratamiento. Puede comunicarse con él llamando al 1-866-VCARES1, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

EL DÍA DE LA INFUSIÓN

Al llegar, deberá registrarse y ponerse cómodo, y el personal de enfermería se encargará del resto. Intente aprovechar este momento para descansar, leer o relajarse. Los siguientes consejos pueden ayudar a que la experiencia del tratamiento sea lo más agradable posible.

- Coma una comida saludable y equilibrada antes de salir de su casa.
- Hidrátese con mucha agua.
- Asegúrese de usar ropa cómoda que permita un fácil acceso al brazo para cada infusión.
- Lleve un bolso con agua, refrigerios, material de entretenimiento, cargadores y cualquier otra cosa que le brinde comodidad durante la infusión.
- Traiga este registro consigo para familiarizarse con el protocolo posterior a la infusión.

Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 4 y 5, y la Información de Prescripción Completa.

Lumvoa™ veligrotug-vvze | VIRIDIAN™ cares

Consejos para después de cada infusión

¡Esperamos que su infusión haya salido bien!
A continuación, encontrará algunos consejos que debe tener en cuenta después de que haya finalizado la infusión.

- Programe su próxima infusión para dentro de 3 semanas.
- Anote cualquier cosa que hubiera querido traer hoy o que desee traer a la próxima infusión.
- Póngase en contacto con su médico o con el equipo de atención para informarles cómo ha ido la infusión.
- Esté atento a cualquier posible efecto secundario. Algunos efectos secundarios pueden aparecer durante la infusión o poco tiempo después. Si cree que está experimentando uno, informe de inmediato a su equipo de atención.
- Si está inscrito en ViridianCares, realice un seguimiento con su PAL para confirmar que recibió la infusión y resolver cualquier pregunta pendiente.

→ **¡Hidrátese, descanse y cuídese!**

Asegúrese de registrar las fechas programadas de sus infusiones en la página 4.

Su PAL es un recurso de apoyo fundamental durante todo su tratamiento. Puede comunicarse con él llamando al 1-866-VCARES1, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este.

Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 4 y 5, y la Información de Prescripción Completa.

Mi plan de tratamiento con Lumvoa

Haga un seguimiento de su tratamiento, una infusión a la vez.

Su tratamiento con Lumvoa debe completarse en tan solo 12 semanas, desde el inicio hasta el final, y consiste en cinco infusiones de 30 a 45 minutos, una vez cada 3 semanas.

Una única infusión i.v. cada 3 semanas durante 12 semanas

Primera infusión

45 minutos

Infusiones posteriores

30 minutos
si es bien tolerada

i.v., intravenoso.

Lumvoa™ veligrotug-vvze | VIRIDIAN™ cares

Utilice la siguiente tabla para hacer un seguimiento de su cronograma de infusiones y de su progreso durante todo el tratamiento

	1.ª infusión (Semana 0)	2.ª infusión (Semana 3)	3.ª infusión (Semana 6)	4.ª infusión (Semana 9)	5.ª infusión (Semana 12)
Fecha de la infusión					
Hora de la infusión					
Lugar					
Registre cualquier cambio que observe en los síntomas de su TED después de cada tratamiento. Es importante que converse con su equipo de atención sobre cualquier cambio.					
Notas					

Si está inscrito en ViridianCares y tiene dificultades para cumplir las citas o pagar los tratamientos, comuníquese con su PAL para recibir asistencia.

Si no acude a la infusión de Lumvoa programada, comuníquese con su equipo de atención lo antes posible para reprogramarla.

USO e INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Uso: Lumvoa es un medicamento con receta que se usa para tratar la enfermedad ocular tiroidea (TED), tanto si la padece desde hace meses o años.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Lumvoa?

Las **reacciones a la infusión** pueden producirse durante o poco después de la infusión de Lumvoa. Informe a su médico o al personal de enfermería de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante o después del tratamiento con Lumvoa:

- Presión arterial alta
- Sensación de calor
- Escalofríos
- Dolor de cabeza
- Cansancio

Lumvoa puede empeorar la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Informe a su médico de inmediato si presenta un empeoramiento de los síntomas de la EII, que pueden incluir diarrea acompañada de dolor de estómago o calambres, sangre en las heces, necesidad repentina de defecar o sensación de tener que defecar aunque haya pocas heces o ninguna.

Lumvoa puede causar un aumento de los niveles de azúcar en sangre. Antes de empezar el tratamiento con Lumvoa, informe a su médico si tiene niveles altos de azúcar en sangre o si tiene diabetes. Es importante que siga sus tratamientos y una dieta adecuada para controlar la glucosa, según lo recetado por su médico.

Lumvoa puede causar problemas auditivos graves, incluida la pérdida de la audición, que en algunos casos puede ser permanente. Informe a su médico si presenta cualquier signo o síntoma de problemas auditivos o cambios en la audición.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en la página siguiente y la Información de Prescripción Completa.

Lumvoa™ veligrotug-vvze | VIRIDIAN™ cares

USO e INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de recibir Lumvoa, informe a su médico si:

- Tiene una enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
- Tiene diabetes o sabe que su nivel de azúcar en sangre es alto.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Lumvoa puede dañar al feto. Informe a su médico si queda embarazada o sospecha que está embarazada durante el tratamiento con Lumvoa. Las mujeres con capacidad de quedar embarazadas deben utilizar un método anticonceptivo eficaz antes de empezar el tratamiento, durante el tratamiento y durante los 6 meses posteriores a la última dosis de Lumvoa.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si Lumvoa pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre las mejores formas de alimentar a su bebé durante el tratamiento con Lumvoa.
- Toma algún medicamento, incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos alimenticios y herbarios. Conozca los medicamentos que toma. Tenga una lista de ellos para mostrársela a su médico y a su farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Lumvoa?

Los efectos secundarios más frecuentes de Lumvoa incluyen calambres o espasmos musculares, dolor de cabeza, problemas auditivos, niveles altos de azúcar en sangre, cansancio, diarrea, molestias en los oídos, reacciones relacionadas con la infusión, náuseas, síntomas similares a los de un resfriado, aumento de una enzima presente en la sangre llamada creatina fosfoquinasa, piel seca y presión arterial alta.

Esta no es una lista completa de todos los posibles efectos secundarios. Informe a su médico o equipo encargado del tratamiento sobre cualquier efecto secundario que pueda tener. Se recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/safety/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. Lumvoa (500 mg) es una inyección para infusión.

Consulte la Información de Prescripción Completa.

VIRIDIAN

Lumvoa™ veligrotug-vvze | VIRIDIAN™ cares

© 2026 Viridian Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados.
Lumvoa™ (veligrotug-vvze), Viridian Therapeutics®, ViridianCares™ y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de Viridian Therapeutics, Inc. US-LV-0002 08/26